





# Les différentes périodes de piégeage du frelon asiatique

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
	Phase 1		Phase 2		Piégeage de printemps			Phase été		Piégeage d'automne		Phase 1 bis
Phases	Commentaires											
Phase 1	<p>Période hivernale. Ne pas piéger. Le piégeage est inefficace et risque de provoquer la capture d'autres espèces à une période critique.</p>											
Phase 2	<p>Apparition de fondatrices. Le piégeage doit être pratiqué à proximité de nids de l'année précédente pour éviter la diffusion des fondatrices. Ne pas le pratiquer ailleurs. Moyennement efficace et risque de capture d'insectes auxiliaires à une période critique.</p>											
Piégeage de printemps	<p>C'EST LA PHASE CLÉ. Les fondatrices sont seules et à la recherche de nourriture sucrée. La prise éventuelle d'autres insectes ne perturbera plus le développement des populations. C'est l'action qui évite la prédation et rompt le cycle de développement de la colonisation. Les nids primaires doivent être recherchés et détruits.</p>											
Phase été	<p>Construction des nids secondaires. Les appâts sucrés sont délaissés.</p>											
Piégeage d'automne	<p>Les appâts sucrés redeviennent attractifs. L'objectif principal du piégeage est la diminution de la prédation au rucher. La pose de réducteur d'entrée anti-frelon améliore considérablement l'efficacité.</p>											
Phase 1 bis Période hivernale	<p>Les nids apparaissent avec la chute des feuilles et doivent être détruits le plus précocement possible. En cas d'impossibilité, poser des pièges en phase 2.</p>											
												
	<p>© UNAF</p>						<p>© Fournier LEGRAND</p>					
	<p>Consils</p>						<p>Consils</p>					
	<p>Ne pas piéger pour éviter la capture des fondatrices des espèces auxiliaires.</p>						<p>Placer les pièges dans les endroits les plus attractifs : ruchers, tas de hausses, compost, passage à essaims, ancien nid... Appâts : panaché ; sirop de fruit + vin ou panaché ; vin blanc + bière + sirop de cassis ou de framboise.</p>					
	<p>Limiter le piégeage aux abords des nids de l'année.</p>						<p>Piégeage difficile. Seuls les appâts « protéinés » restent attractifs (sardines...). Maintenance difficile.</p>					
	<p>Le piégeage redevient possible. Les futures reproductrices peuvent aussi être abondamment capturées. Appâts sucrés : sirop de nourrissage + miel parfumé (bruyère ou châtaignier) + alcool aromatique (porto ou pineau...).</p>						<p>Si le frelon n'est plus présent sur le rucher, éviter le piégeage.</p>					
												
	<p>© Foote.com</p>						<p>© Foote.com</p>					

Ces périodes sont définies à titre indicatif et doivent être adaptées à chaque région.

